Acido Lattico

30 minuti in sala d'attesa prima del prelievo

Esami del sangue generici

Digiuno dalla mezzanotte

Curva glicemica 75gr

Assunzione di glucosio in laboratorio
Durata dell'esame 2h in laboratorio

Breath Test per Helicobatter Pylori

Digiuno
Non assumere gastro protettori
per almeno una settimana

Orari di apertura

Prelievi

Dal lunedì al sabato: 6:30 - 12:00

Ritiro referti

Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 13:00
e 15:00 - 18:00
Sabato: 10:00 - 12:00

Scansionami

viale De Gasperi 16
63074 San Benedetto del Tronto
0735 84742
direzione@saluslab.com

SALUS

Autorizzazione n. 156/2016
Accreditamento Servizio Sanitario Nazionale: ★★★★★
Categoria Eccellenza

Modalità per la raccolta dei campioni

www.saluslab.com

Esami Urine
Test di gravidanza
Urinocoltura

Chiedere al laboratorio (o acquistare in farmacia) un contenitore sterile e raccogliere le prime urine del mattino dopo l'igiene personale.

Raccolta Urine 24h

In un contenitore adatto (acquistabile in farmacia) raccogliere le urine delle 24h nel seguente modo:
1) Primo giorno scartate le prime urine del mattino
2) Raccogliere le altre urine fino alla stessa ora del mattino seguente.

Tamponi Cervico Vaginali

Unica accortezza non essere nel periodo mestruale e non effettuare l'igiene personale prima dell'esame.

Esame Latte Materno

Effettuare la raccolta con il tiralatte, devono essere raccolti almeno 15ml di latte.
La raccolta va fatta da entrambe le mammelle, e il volume totale di latte deve comprendere parte dell'inizio della poppata, parte della metà e parte della poppata finale.

Scotch Test

Al mattino prima dell'igiene personale applicare un pezzetto di scotch trasparente sullo sfintere anale, applicando poi ben disteso sul vetrino fornito dal laboratorio. È consigliabile effettuare la prova per tre giorni consecutivi.

Ricerca sangue occulto nelle feci

Raccogliere una piccola quantità di feci nel contenitore apposito che potete anche ritirate presso il laboratorio.

Citologico delle urine

Eliminare le urine del primo mattino.
Eseguire l'igiene personale e bere due o tre bicchieri di acqua entro un'ora.
Raccoglere le urine in un contenitore sterile.
È preferibile effettuare l'esame su tre campioni raccolti in tre giorni successivi.

Esame liquido seminale

1) Osservare 5gg di astinenza dai rapporti sessuali
2) Raccogliere lo sperma in contenitore sterile
3) Consegnarlo al laboratorio entro 30 minuti dalla raccolta.

Breath Test per intolleranza al lattosio

Preparazione del paziente per l'esecuzione dell'H2 breath test per diagnosi di intolleranza al lattosio.

Osservate attentamente le seguenti istruzioni:
1) Nei sette giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici, lassativi.
2) Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante.
3) Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusicamente con:
COLAZIONE: una tazza di tè
PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio
CENA: una bistecca oppure un pesce lesso con insalata.
4) Dalle ore 21:00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua)
5) Dalle ore 7:00 del giorno dell'esame il paziente DEVE bere due bicchieri d'acqua, restare a digiuno, non fumanre, non lavarsi i denti, non svolgere attività fisica.

Esame Colturale liquido seminale

Dopo l'igiene personale raccogliere lo sperma in un contenitore sterile e consegnarlo al laboratorio.